

NEW N-SUBSTITUTED-1-DEOXYNOJIRIMYCIN DERIVATIVE AND METASTASIS-INHIBITOR FOR CANCEROUS CELL

Publication number: JP2306962 (A)

Publication date: 1990-12-20

Inventor(s): KURIHARA HIROSHI; YOSHIDA SEISHI; TSURUOKA TSUTOMU; TSURUOKA TAKASHI; YAMAMOTO HARUO; FUKUYASU SHUNKAI

Applicant(s): MEIJI SEIKA KAISHA

Classification:

- International: C07D211/46; A61K31/445; A61P35/00; C07D211/00; A61K31/445; A61P35/00; (IPC1-7): A61K31/445; C07D211/46

- European:

Application number: JP19890127499 19890519


Priority number(s): JP19890127499 19890519

Abstract of JP 2306962 (A)

NEW MATERIAL: An N-substituted-1-deoxynojirimycin derivative expressed by the formula [A is 3-5C hydrocarbon may be substituted with OH, halogenated alkyl or alkoxy (said hydrocarbon may have double or triple bond); Z is phenyl, fluorine-substituted phenyl, biphenyl, cycloalkyl or halogen-substituted alkyl].

EXAMPLE: An N-(3-phenyl-3-trifluoromethyl-2-propenyl)-1-deoxynojirimycin. **USE:** Used as metastasis-inhibitor for cancerous cell.

PREPARATION: For instance, 1-deoxynojirimycin is reacted with various aralkylation agent or aralkenylation agent in the presence of deoxidizer such as alkali hydroxide to afford the compound expressed by the formula.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平2-306962

⑬ Int. Cl.⁹

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成2年(1990)12月20日

C 07 D 211/48
A 61 K 31/445

ADU

7180-4C

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全12頁)

⑮ 発明の名称 新規N-置換-1-デオキシノジリマイシン誘導体及びそれを含有する癌細胞転移抑制剤

⑯ 特 願 平1-127499

⑰ 出 願 平1(1989)5月19日

⑱ 発 明 者 栗 原 寛 神奈川県横浜市港北区師岡町760 明治製菓株式会社中央研究所内

⑲ 発 明 者 吉 田 清 史 神奈川県横浜市港北区師岡町760 明治製菓株式会社中央研究所内

⑳ 発 明 者 鶴 岡 勉 神奈川県横浜市港北区師岡町760 明治製菓株式会社中央研究所内

㉑ 出 願 人 明治製菓株式会社 東京都中央区京橋2丁目4番16号

㉒ 代 理 人 弁理士 小 堀 益 外1名


最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称 新規N-置換-1-デオキシノジリマイシン誘導体及びそれを含有する癌細胞転移抑制剤

2. 特許請求の範囲


1. 式



式中、Aは水酸基、ハロゲン化アルキル基又はアルコキシ基で置換されてもよい炭素数3乃至5の炭化水素基を表し、この炭化水素基は二重又は三重結合を有していてもよい、Zはフェニル基、フッソ置換フェニル基、ビフェニル基、シクロアルキル基、又はハロゲン置換アルキル基を表す。

で示されるN-置換-1-デオキシノジリマイシン誘導体。

2. 式



式中、Aは水酸基、ハロゲン化アルキル基、アルコキシ基で置換されてもよい炭素数3乃至5の炭化水素基を表し、この炭化水素基は二重又は三重結合を有していてもよい、Zはフェニル基、フッソ置換フェニル基、ビフェニル基、シクロアルキル基又はハロゲン置換アルキル基を表す。

で示されるN-置換-1-デオキシノジリマイシン誘導体又はその薬理的に許容される酸との付加塩を有効成分とすることを特徴とする癌細胞転移抑制剤。

3. 発明の明確な説明

(医薬上の利用分野)

本発明は、癌細胞の転移抑制を阻害する新規N-置換-1-デオキシノジリマイシン誘導体並びにその塩を有効成分とする癌細胞転移抑制剤に関する。

(従来の技術)

現在使用されている抗癌剤は種々あるが、その主体は、癌細胞を殺菌させるか、人の免疫系を

介して死滅させる薬剤であり、癌の根本的な治療に対して有効な薬剤は未だ得られていない。

また、化学療法剤の有効性が低い癌細胞に対しては外科手術、放射線療法等の物理的療法が行われ、癌細胞の除去という点では成功率が大幅に向上している。しかし、癌細胞の転移を誘発することも事である。

(発明が解決しようとする課題)

上述の如く、従来の癌治療において、癌細胞の転移が癌治療患者の予後を左右する最大の課題となっている。

従って、この癌細胞の転移を抑制することが求められる新薬の開発は現在最も要望されている課題である。

本発明はこの課題を解決する癌細胞転移を有効に抑制する物質並びに同物質を有効成分とする癌細胞転移抑制剤を提供することを目的とするものである。


(課題を解決するための手段)

本発明者らは先に癌細胞転移抑制作用を有する

N-置換-1-デオキシノジリマイシン誘導体を見出し、特開昭63-31095号公報、特開昭63-93873号公報、特開昭63-97454号公報、特開昭63-104850号公報、特開昭63-147815号公報及び特開昭63-147816号公報に開示した。

本発明者らは更に1-デオキシノジリマイシンの新規なN-置換誘導体を合成し、その広範な探索を行ったところ、強い癌細胞転移抑制作用を有する一群の新規な化合物を見出し、本発明を完成した。

本発明は、式(1)



(1)

(式中、Aは水酸基、ハロゲン化アルキル基又はアルコキシ基で置換されてもよい炭素数3乃至5の炭化水素基を表し、この炭化水素基は二重又は三重結合を有してもよい、Zはフェニル基、フッソ置換フェニル基、ビフェニル基、シクロアルキル基又はハロゲン置換アルキル基を表す。)を示

されるN-置換-1-デオキシノジリマイシン誘導体、並びに同化合物又はその薬理的に許容される酸との付加塩を有効成分とする癌細胞転移抑制剤である。

本発明の式(1)で示されるN-置換-1-デオキシノジリマイシン誘導体は文献未載の新規物質である。

そして、このN-置換-1-デオキシノジリマイシン誘導体に含まれる化合物の例としては次のような物質が挙げられる。

N-(3-メトキシメチル-3-フェニル-2-プロペニル)-1-デオキシノジリマイシン

N-(3-フェニル-3-トリフロロメチル-2-プロペニル)-1-デオキシノジリマイシン

N-(3-(4-フロロフェニル)-2-プロペニル)-1-デオキシノジリマイシン

N-(3-(3-フロロフェニル)-2-プロペニル)-1-デオキシノジリマイシン

N-(3-(2-フロロフェニル)-2-プロペニル)-1-デオキシノジリマイシン

N-(3-(4-ビフェニルプロピル))-1-デオキシノジリマイシン

N-(3-(4-フロロフェニル)-プロピル)-1-デオキシノジリマイシン

N-(3-シクロヘキシルプロピル)-1-デオキシノジリマイシン

N-(3-フェニル-2-プロピニル)-1-デオキシノジリマイシン

N-(2,3-ジヒドロキシ-3-フェニルプロペニル)-1-デオキシノジリマイシン

N-(8,6,8-トリフロロヘキシル)-1-デオキシノジリマイシン

N-(5,5,5-トリフロロペンチル)-1-デオキシノジリマイシン

N-(4,4,4-トリフロロブチル)-1-デオキシノジリマイシン

また、本発明のN-置換-1-デオキシノジリマイシン誘導体を癌細胞転移抑制剤として使用する場合の薬理的に許容される酸の付加塩としては、塩酸、臭化水素酸、硫酸、硝酸、炭酸等の無機酸、

酢酸、酢酸、プロピオン酸、コハク酸、グリコール酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、マレイン酸、フマル酸、安息香酸、ナリチル酸、ノタンズルホン酸等の有機酸、更にはアスパラギン酸、グルタミン酸等のアミノ酸との付加塩が挙げられる。

本発明の化合物はいずれも文献未記載の新規化合物である。その合成法としては本発明者らによって見出された放線菌の代謝産物であるノゾリマイシン(5-アミノ-5-デオキシ-D-グルコピラノース)(特公昭43-760号公報参照)の還元により得られる1-デオキシノゾリマイシン(Tetrahedron, 24, 2125(1968)参照)を原料とする方法が最も一般的である。即ち、1-デオキシノゾリマイシンを各種のアルコール類、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、スルホラン等の極性溶媒又は、これらの混合溶媒中でアラルキルハライド、アルケニルハライド又はアラルキルスルホン酸エステル、アラルケニルスルホン酸エステル等で代表される

各種のアラルキル又はアラルケニル化試料と水酸化アルカリ、炭酸アルカリ、置換炭酸アルカリ又は適当な有機アミン類等の置換剤の存在下で室温又は加温することによって本発明の式(1)の化合物のN-置換A-Z基を導入することができる。また、水酸基を適当な保護基、例えばアセチル基、ベンゾイル基、テトラヒドロピラニル基、1-ブチルジメチルシリル基等で保護した1-デオキシノゾリマイシンを原料として用い、N-置換反応を行わたのち、脱保護する方法も採用される。また反応試薬としてカルボニル基を有する試薬を用いて還元的条件下、例えば銅酸、シアノ水素化カルシウムナトリウム、水素化カルシウムナトリウム或いは適当な金属触媒、例えば酸化白金、パラジウム、ラネーニッケル等の存在下、水素雰囲気下でいわゆる還元的アルキル化を行う方法、或いは1-デオキシノゾリマイシンとアラルキルカルボン酸、又はアラルケニルカルボン酸とのアミドを還元して目的物を得る方法も使用することができる。これらの化合物は必要に応じて再結晶、カラムクロ


マトグラフィー等の一般的な精製法によって本発明の式(1)の化合物を得る。

本発明の化合物の置換基の形成及び導入に関しては合目的な適宜の方法によって合成することができる。式(1)のA-Z基を構築するためのアラルキル、アラルケニル、アラルケニル化剤の製造については適当な方法として下記の5通りの製造法を示す。

製造法1

化合物(2)とビニル金属化合物、例えば塩化ビニルマグネシウム、臭化ビニルマグネシウム、炭化ビニルマグネシウム、ビニルリチウム、ジビニル亜鉛、ジビニル銅、ジビニルセリウム等とを極性溶媒中、好ましくはエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン中で-50℃～室温、10分～24時間反応させることによって化合物(3)を合成することができる。化合物(3)を塩酸、臭化水素酸、オキサリルクロリド、ハロゲン化チオニル、オキシハロゲン化炭、三ハロゲン化炭、五ハロゲン化炭、3置換ホスフィン-四ハロゲン化炭

素、アリル又はアルキルスルホニルハライドと溶解媒或いはベンゼン、トルエン、エーテル、塩化メチレン、アセトニトリル等の溶媒中で0℃～100℃、30分～24時間反応させることによって化合物(3)のアリルアルコール部分の経路を伴いながら化合物(4)を合成することができる。



(式中Yは水素原子、ハロゲン原子、アラルキル基、水酸基を有し、Iは水素原子、ハロゲン原子、アラルキル基、アルコキシ基、ハロゲン置換アルキル基を表す、Xはハロゲン原子、アルキル又はアリルスルホニロキシ基を表す。ハロゲン原子としては、塩素、臭素、炭素等を、アルキル又はアリルスルホニロキシ基としてはノタンズルホニルオキシ基、トリフクロノタンズルホニルオキシ基、

p-トルエンスルホニルオキシ基等を示す。Mは1価又は2価の金属或いはその塩を表し、金属としてはリチウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、亜鉛、セシウム、銀を示す)

製造法2

化合物(2)を適当な溶媒、好ましくはベンゼン、トルエン、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、塩化ノチレン、クロロホルム、メタノール、エタノール中カルボアルコキシノチレントリ置換ホスホランと0℃〜60℃で10分〜24時間反応させるか、又は適当な塩基、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化アルカリ、炭酸アルカリの存在下、ジアルキルホスホノ酢酸アルキルエステルとを0℃〜60℃で10分〜24時間反応させ、不飽和エステル(5)を合成する。化合物(5)を適当な非プロトン性溶媒、好ましくはエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン中、適当な水酸化金属相転移剤、好ましくは水酸化アルミニウムリチウム、ジイソブチルアルミニウムヒドリド、水酸化ビス(2-メトキシエト

キシ)アルミニウムナトリウムと-78℃〜100℃で30分〜18時間反応させることによって化合物(6)を合成することができる。化合物(6)を塩酸、臭化水素酸、オキソリルクロリド、ハロゲン化チオニル、オキシハロゲン化剤、三ハロゲン化剤、五ハロゲン化剤、3置換ホスフィン-四ハロゲン化炭素、アリル又はアルキルスルホニルハライドと無溶媒或いはベンゼン、トルエン、エーテル、塩化ノチレン、アセトニトリル等の溶媒中0℃〜100℃で30分〜24時間反応させることにより、化合物(4)を合成することができる。




(式中、Y₁、Y₂は前記と同一意味を有し、Rはアルキル基などのカルボキシル基の保護基を表す)

製造法3

製造法2によって得られるアルケニルアルコール(6)を適当な有機溶媒、例えばメタノール、

エタノール、酢酸、テトラヒドロフラン、酢酸エチル等中で、金属触媒、例えばパラジウム-炭素、白金、ランタニウム等の存在下で水素雰囲気下で30分〜24時間還元し、飽和アルコール(7)を合成することができる。化合物(7)を臭化水素酸、オキソリルクロリド、ハロゲン化チオニル、オキシハロゲン化剤、三ハロゲン化剤、五ハロゲン化剤、3置換ホスフィン-四ハロゲン化炭素、アリル又はアルキルスルホニルハライド等の溶媒中で0℃〜100℃、30分〜24時間反応させることにより、化合物(8)を合成することができる。




(式中、Y₁、Y₂、Xは前記と同一意味を有す)

製造法4

1-アリルアセチレン誘導体(9)を適当な塩基、例えばn-ブチルリチウム、リチウムジイソプロピルアミド、ナトリウムアミド等でアセチリ

ドとしたのち、ホルマリンと反応させることによって、アルケニルアルコール(10)を合成することができる。化合物(10)をオキソリルクロリド、ハロゲン化チオニル、オキシハロゲン化剤、三ハロゲン化剤、五ハロゲン化剤、3置換ホスフィン-四ハロゲン化炭素、アリル又はアルキルスルホニルハライドと無溶媒或いはベンゼン、トルエン、エーテル、塩化ノチレン、アセトニトリル等の溶媒中0℃〜100℃で30分〜24時間反応させることにより、化合物(11)を合成することができる。



(式中Y₁、Y₂、Xは前記と同一意味を有す)

製造法5

定置ハロゲン置換アルキル化剤の製造法としては、例えばω-ハロゲン置換脂肪族(12)を適当なフッ素化剤、例えば四フッ化イオウ(Angew. Chem. Internat. Ed., 1, 467 (1962))で処理することに

を得た。

$^1\text{H-NMR}(\text{CDCl}_3) \delta$

3.80(dq, 2H), 8.62(tq, 1H), 7.20~7.60(m, 5H)

工程 3

N-(3-フェニル-3-トリフロロメチル-2-プロペニル)-1-デオキシノジリマイシン
デオキシノジリマイシン163 mg(1.00 mmol)と1-ブロモ-3-フェニル-3-トリフロロメチル-2-プロペン318 mg(1.20 mmol)をジメチルホルムアミド5 mlに溶解し、炭酸カリウム207 mg(1.50 mmol)を加えて室温下8時間攪拌する。反応混合物に飽和食塩水を加えてn-ブタノールで抽出する。抽出液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(抽出溶媒:クロロホルム-nブタノール(10:1))で精製し311 mg(90%)の無色固体を得た。

$^1\text{H-NMR}(\text{CD}_3\text{OD}) \delta$

2.15(m, 2H), 3.10(dd, 1H), 3.16(t, 1H),

3.31(m, 1H), 3.42(t, 1H), 3.53(m, 1H),

3.78(dd, 1H), 3.98(ABX type, 2H).

モル)を塩化ノチレン20 mlに溶解し、カルボノトキシノチレントリフェニルホスホラン3.67 g(11.0 mmol)を加え、室温下3時間攪拌した。固体を濾別し、濾液を濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(抽出溶媒:酢酸エチル-ヘキサン(1:4))で精製し、無色針状品1.81 g(90%)を得た。

$^1\text{H-NMR}(\text{CDCl}_3) \delta$

4.30(d, 2H), 6.25(m, 1H), 6.55(d, 1H),

6.95(m, 2H), 7.35(m, 2H)

工程 2

3-(4-フロロフェニル)-2-プロペン-1-オール

ノチル-3-(4-フロロフェニル)-2-プロペノエート1.61 g(9.00 mmol)をエーテル50 mlに溶解し、氷冷下水素化アルミニウムリチウム205 mg(5.40 mmol)をエーテル3 mlに添加したものに添加する。添加後室温下30分攪拌し、過剰の試薬を水で分解し、固体を濾別する。濾液を濃縮し3-(4-フロロフェニル)-2-プロ

6.72(t, 1H), 7.32(m, 2H), 7.46(m, 3H)

製造例 2

N-(3-メトキシノチル-3-フェニル-2-プロペニル)-1-デオキシノジリマイシン

製造例1と同様にして合成した1-ブロモ-3-メトキシノチル-3-フェニル-2-プロペンを用いて合成した。

$^1\text{H-NMR}(\text{CD}_3\text{OD}) \delta$

2.13(m, 2H), 3.05(dd, 1H), 3.16(t, 1H),

3.34(m, 1H), 3.44(t, 1H), 3.31(m, 1H),

3.38(s, 3H), 3.76(dd, 1H),

3.97(ABX type, 2H), 4.16(s, 2H),

6.08(t, 1H), 7.15~7.50(m, 5H)

製造例 3

N-(3-(4-フロロフェニル)-2-プロペニル)-1-デオキシノジリマイシン

工程 1

ノチル-3-(4-フロロフェニル)-2-プロペノエート

4-フロロベンズアルデヒド1.24 g(10.0 mmol)

ベン-1-オール1.33 g(97%)を得た。

$^1\text{H-NMR}(\text{CDCl}_3) \delta$

4.52(d, 2H), 6.31(m, 1H), 7.01(m, 2H),

7.45(m, 2H)

工程 3

1-ブロモ-3-(4-フロロフェニル)-2-プロペン

3-(4-フロロフェニル)-2-プロペン-1-オール1.34 g(8.82 mmol)とトリ-n-オクタチルホスフィン4.28 g(11.5 mmol)をエーテル20 mlに溶解し、氷冷下四氯化炭3.52 g

(10.6 mmol)を数回に分け加える。室温下30分攪拌した後、沈殿物を濾別し、濾液を濃縮し残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(抽出溶媒:ヘキサン)で精製し1.61 g(85%)の無色抽出物を得た。

$^1\text{H-NMR}(\text{CDCl}_3) \delta$

3.35(d, 2H), 6.30(m, 1H), 7.00(m, 2H),

7.40(m, 2H)

Mass m/z 214, 216

工程4

N-(3-(4-フロロフェニル)-2-プロベニル)-1-デオキシノジリマイシン

1-プロモ-3-(4-フロロフェニル)-2-プロペン1.61g (7.5ミリモル)と1-デオキシノジリマイシン1.22g (7.5ミリモル)をジノチルホルムアミド10mlに溶解し、炭酸カリウム3.12g (22.5ミリモル)を加え、室温下2時間攪拌した。反応混合物を水に注いでn-ブタノールで抽出する。溶液を留去した後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(抽出溶媒:クロロホルム-メタノール(10:1))で精製し1.36g (61%)の淡黄色の固体を得た。

¹HMR(CD₃OD) δ

2.4~4.2(m, 16H), 6.40(m, 1H), 6.7(m, 1H), 7.10(m, 2H), 7.55(m, 2H)

Mass m/z 298 (PD, M+1)

製造例4

N-(3-(3-フロロフェニル)-2-プロベニル)-1-デオキシノジリマイシン

Mass m/z (PD, M+1)

製造例6

N-(3-(4-ビフェニル)プロピル)-1-デオキシノジリマイシン

工程1

ノチル-3-(4-ビフェニル)アクリレート4-ビフェニルカルボキシアルデヒド1.10g (5.00ミリモル)をジクロロエタン20mlに溶解し、カルボメトキシメチレントリフェニルホスホラン3.03g (9.10ミリモル)を加え、室温下1時間攪拌する。溶液を留去後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(抽出溶媒:エーテル-ヘキサン(1:10))で精製し、1.12g (78%)の無色結晶を得た。

¹HMR(CDCl₃) δ

3.83(s, 3H), 6.49(d, 1H), 7.30~7.60(m, 9H), 7.75(d, 1H)

工程2

ノチル-3-(4-ビフェニル)プロピオネート

製造例3と同様にして合成した。

¹HMR(CD₃OD) δ

2.15(m, 2H), 3.04(dd, 1H), 3.14(t, 1H), 3.2~3.35(m, 1H), 3.39(t, 1H), 3.49(m, 1H), 3.68(dd, 1H), 3.94(ABX type, 2H), 6.41(d, 1H), 6.59(d, 1H), 6.95(d, 1H), 7.16(dd, 1H), 7.21(d, 1H), 7.31(ddd, 1H)

Mass m/z 298 (PD, M+1)

製造例5

N-(3-(2-フロロフェニル)-2-プロベニル)-1-デオキシノジリマイシン

製造例3と同様にして合成した。

¹HMR(CD₃OD) δ

2.1~2.25(m, 2H), 3.06(dd, 1H), 3.14(t, 1H), 3.24~3.35(m, 1H), 3.39(t, 1H), 3.50(m, 1H), 3.71(m, 1H), 3.94(ABX type, 2H), 6.45(d, 1H), 6.72(d, 1H), 7.0~7.16(m, 2H), 7.2~7.28(m, 1H), 7.53(d, 1H)

ノチル-3-(4-ビフェニル)アクリレート1.40g (4.40ミリモル)を酢酸エチル50mlに溶解し、10%Pd-C70mgを加えて常圧下12時間攪拌還元する。反応を撹別後、溶液を留去し、1.01g (97%)の無色結晶物を得た。

¹HMR(CDCl₃) δ

2.68(t, 2H), 3.00(t, 2H), 3.68(s, 3H), 7.20~7.70(m, 9H)

工程3

3'-(4-ビフェニル)-1-プロパロール氷冷下、水酸化アルミニウムリチウム110mg (2.90ミリモル)をエーテル10mlに懸濁した中へノチル-3-(4-ビフェニル)プロピオネート1.01g (4.20ミリモル)をエーテル35mlに溶解したものを滴下する。同温度で1時間攪拌後、過剰の試薬を水で分解し、無機物を撹別、溶液を乾燥後、蒸留し、861mg (96%)の無色結晶を得た。

¹HMR(CDCl₃) δ

1.56(br, 1H), 1.94(m, 2H), 2.77(m, 2H), 3.71(m, 2H), 7.15~7.76(m, 9H)

工程4

3-(4-ビフェニル)-1-ブロモプロパン
3-(4-ビフェニル)-1-プロパノール
119 g (2.00ミリモル) とトリフェニルホスフィン629 g (2.40ミリモル) をエーテル10mlに溶解し氷冷下四員化炭素 930 mg (2.80ミリモル) を数回に分け加える。室温下1時間攪拌した後、比較物を検出し、溶媒を減圧し残液をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:ヘキサン)で精製し506 g (92%) の無色油状物を得た。

¹HMR(CDCl₃) δ

2.20(quo, 2H), 2.83(t, 2H), 3.44(t, 2H),
7.23~7.65(m, 9H)

工程5

N-(3-(4-ビフェニル)プロピル)-1-デオキシノジリマイシン

3-(4-ビフェニル)-1-ブロモプロパン
140 g (0.50ミリモル) と1-デオキシノジリマイシン82 g (0.5ミリモル) をジメチルホルムアミド1mlに溶解し、炭酸カリウム136 g (1.00

製造例8

N-(3-シクロヘキシルプロピル)-1-デオキシノジリマイシン

製造例6と同様に合成した。

¹HMR(CD₃OD) δ

0.75~1.08(m, 2H), 1.08~1.45(m, 1H),
1.45~2.00(m, 8H), 2.70~3.83(m, 8H),
4.00(ABX type, 2H)

製造例9

N-(フェニル-2-プロピニル)-1-デオキシノジリマイシン

工程1

1-フェニル-3-プロモプロピン

1-フェニル-2-プロピン-1-オール660 g (5.00ミリモル) と四員化炭素4.98 g (15.0ミリモル) をテトラヒドロフラン30mlに溶解し、氷冷下トリフェニルホスフィン2.62 g (10.0ミリモル) を数回に分けて加える。室温下10時間攪拌後、固体を濾別し、溶媒を減圧する。残液をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:ヘキサ

ン)を加え、80℃、4時間加熱した。反応混合物を水に注いで塩酸酸性としエーテルにて洗浄、水層をアンモニアアルカリとし、n-ブタノールで抽出する。溶媒を除去した後、残液をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:クロロホルム-ノタノール(10:1))で精製し117 g (66%) の固体を得た。

¹HMR(CD₃OD) δ

1.86(m, 2H), 2.20(br, 2H), 2.65(m, 3H),
2.89(m, 1H), 3.00(m, 1H), 3.14(t, 1H),
3.47(m, 1H), 3.84(d, 2H), 7.15~7.65(m, 9H)

製造例7

N-(3-(4-フロロフェニル)プロピル)-1-デオキシノジリマイシン

製造例6と同様に合成した。

¹HMR(CD₃OD) δ

1.38(m, 2H), 2.05~2.22(m, 2H), 2.64(m, 2H),
2.98(dd, 1H), 3.13(t, 1H), 3.30(m, 1H),
3.38(t, 1H), 3.45(m, 1H),
3.64(m, 1H), 3.85(m, 2H), 7.18~7.35(m, 4H)

ン)で精製し、181 g (65%) の無色油状物を得た。

¹HMR(CDCl₃) δ

1.20 (br, 1H), 2.27(s, 1H), 7.15~7.40(m, 5H)

工程2

N-(フェニル-2-プロピニル)-1-デオキシノジリマイシン

1-デオキシノジリマイシン163 g (1.00ミリモル) と1-フェニル-3-プロモプロピン215 g (1.10ミリモル) をジメチルホルムアミド3mlに溶解し、炭酸カリウム166 g (1.20ミリモル) を加え、室温下8時間攪拌する。反応混合物を水に注いで塩酸酸性としエーテルにて洗浄、水層をアンモニアアルカリとし、n-ブタノールで抽出する。溶媒を除去した後、残液をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:クロロホルム-ノタノール(10:1))で精製し、181 g (65%) の固体を得た。

¹HMR(CD₃OD) δ

2.31(d, 1H), 2.57(t, 1H), 2.98(dd, 1H),

3.19(t, 1H), 3.50(t, 1H), 3.61(o, 1H),
3.82(ABX type, 2H), 3.98(dd, 2H)

製造例10

N-[(2, 3-ジヒドロキシ)-3-フェニ
ルプロピル]-1-デオキシノジリマイシン

工程1

N-(3-フェニル-2-プロペニル)-1-
デオキシノジリマイシンテトラアセテート

シンナミルプロピル 1.42 g (7.20ミリモル) と
1-デオキシノジリマイシン 978 mg (6.00ミリモ
ル) をジメチルホルムアミド 10 ml に溶解し、炭酸
カリウム 996 mg (7.20ミリモル) を加えて、4時
間、60~65℃に加熱する。冷却、塩化メチレン 3
ml で希釈し、無水酢酸 3.06 g (30.0ミリモル) と
ピリジン 2.31 g (30.0ミリモル) を加えて室温下
16時間攪拌する。反応液を酢酸エチル 150 ml で希
釈し、飽和炭酸水素ナトリウム、水で順次洗浄、
乾燥後、溶媒を留去する。残渣をシリカゲルカ
ラムクロマトグラフィー〔溶出溶媒：ヘキサン-酢
酸エチル (3:1)〕で精製し、2.12 g (81%)

収：ヘキサン-酢酸エチル (1:1) で精製し、
222 mg (68%) のカラメルを得た。この化合物は
2種の立体異性体の混合物 (2:1) である。

¹HMR (CDCl₃) δ

2.32(dd), 2.57(dd), 2.70(ABX type), 2.85(dd),
2.97(m), 3.11(m), 3.12(dd), 3.16(m), 3.22(dd),
3.82(br), 4.13(ABX type), 4.20(ABX type),
4.48(t), 4.53(t), 4.86~5.12(m),
7.2~7.4(m, 5H)

工程3

N-[(2, 3-ジヒドロキシ)-3-フェニ
ルプロピル]-1-デオキシノジリマイシン

N-[(2, 3-ジヒドロキシ)-3-フェニ
ルプロピル]-1-デオキシノジリマイシンテ
トラアセテート 196 mg (0.42ミリモル) をメタノ
ール 5 ml に溶解し、炭酸カリウム 3 mg を加えて室温
下 3時間攪拌する。溶媒を留去した後、残渣をシ
リカゲルカラムクロマトグラフィー〔溶出溶媒：
クロロホルム-メタノール (3:1)〕で精製し
128 mg (98%) の無色カラメルを得た。この化合

物の結晶を得た。

¹HMR (CDCl₃) δ

2.01(m, 6H), 2.03(m, 3H), 2.09(m, 3H),
2.38(dd, 1H), 2.70(dt, 1H), 3.25(dd, 1H),
3.38(dd, 1H), 3.59(ddd, 1H), 4.18(dd, 1H),
4.32(dd, 1H), 4.90~5.20(m, 3H), 6.22(dt, 1H),
6.56(d, 1H), 7.15~7.50(m, 5H)

工程2

N-[(2, 3-ジヒドロキシ)-3-フェニ
ルプロピル]-1-デオキシノジリマイシンテ
トラアセテート

N-(3-フェニル-2-プロペニル)-1-
デオキシノジリマイシンテトラアセテート 305 mg
(0.70ミリモル) と N-メチルモルホリン-N-
オキシド 98 mg (0.84ミリモル) を 50% アセトン 8
ml に溶解し、四酸化オスミウム 2 mg を加え 2時間
攪拌する。亜硫酸ナトリウム 250 mg、水 3 ml を加
えて 1時間攪拌した後、水 30 ml で希釈し酢酸エチ
ルで抽出、水洗、乾燥後、溶媒を留去する。残渣
をシリカゲルカラムクロマトグラフィー〔溶出溶

媒は 2種の立体異性体の混合物 (2:1) である。

¹HMR (CD₃OD) δ

2.05(dd), 2.17(dd), 2.23~2.35(m), 2.54(dd),
2.87(dd), 2.98(dd), 3.10(t), 3.14(t),
3.2~4.0(m), 4.50(d), 4.68(d),
7.15~7.50(m, 5H).

次に本発明の N-置換-デオキシノジリマイシ
ン誘導体の癌細胞転移抑制作用の評価結果を示す。
効果試験

試験法

マウスの癌細胞であるノラノーマ B16 株より
フィドラー (Fidler) の方法 (Method in Cancer
Research, 15, 339-439, 1978) をもとに B16 高転
移株を選別し、使用した。転移抑制作用の評価は
キジマースダ (Kijima-Soda) 等の方法 (Proc.,
Natl. Acad. Sci., U.S.A., 83, 1752-1756,
1986; Cancer Research, 46, 858-862, 1986.) を
もとにして行った。まず B16 高転移株を牛胎児血
清を加えたダルベコ MEM 培地 (DME 培地) に懸
え、一般式 (1) で表される N-置換-1-デオ

キシノグリマイシンを加え、2～4日間、5%CO₂の存在下37℃で培養し、増殖した細胞をトリプシン-E D T A 溶液で培養容器より剥がした。この細胞をCa⁺⁺とMg⁺⁺を含まないダルベッコの平衡塩類溶液で生細胞として1ml当たり1×10⁶細胞になるように懸濁した。

この懸濁液の0.1 mlをマウス尾静脈中に注入し細胞を移植し14日間飼育した後、開腹して肺を摘出し、肺表面及び内部に形成されたB16高転移性の転移結節数を数え、薬剤処理をしなかった対照と比較した。

試験例1 細胞障害性

B16高転移性を10%牛胎児血清を加えたDME培地に5%CO₂の存在下37℃で培養し、トリプシン-E D T A 溶液で培養容器より剥がし、1ml当たり1×10⁶細胞になるように懸濁した。この懸濁液の150 μlを被検薬あるいは対照薬溶液50 μlにそれぞれ加え混合した。この後、4日間培養し、倒立顕微鏡下で生死を観察し、細胞障害性を判定した。その結果を表1の通りであった。

の平衡塩類溶液で生細胞として1ml当たり1×10⁶細胞になるように懸濁し、その0.1 mlをB D F、マウス(8週令、雄)の尾静脈に注入し、細胞を移植した。14日間飼育後開腹し、開腹して肺を摘出し、肺表面及び内部に形成されたB16高転移性の転移結節数を数えた。その結果を表2に示した。

表 2

添加薬剤	肺転移結節数(平均±標準偏差)
無添加	207±47
製造例化合物9 (30 μg/ml)	96±29
製造例化合物10 (30 μg/ml)	60±18
製造例化合物7 (30 μg/ml)	18±7

以上の結果より本発明の化合物の処理で肺に形成される転移結節数は大きく減少した。

本発明の癌細胞転移阻害剤は、上記のN-置換-1-デオキシノグリマイシン誘導体を含有する経口、非経口製剤として臨床的に肺癌、動脈硬化、皮膚、皮下、皮内、直腸及び筋肉内を経口又は経口にて投与される。また腫瘍に直接投与することにより、より強い効果が期待できる。投与量は投与形態、

表 1

使用細胞	B16高転移性	
添加薬剤	濃度	生存
無添加		+
製造例化合物 9	10 μg/ml	+
	30 μg/ml	+
	100 μg/ml	+
製造例化合物 10	10 μg/ml	+
	30 μg/ml	+
	10 μg/ml	+
製造例化合物 7	10 μg/ml	+
	30 μg/ml	+
	100 μg/ml	+
アドリアマイシン (対照)	0.1 μg/ml	-

表中+は生存、-は死滅を要す。

以上の試験結果より本発明の化合物はB16高転移性に対して細胞障害性を示さなかった。

試験例2 抗転移作用

B16高転移性を10%牛胎児血清を加えたDME培地に植え、被検薬を1ml当たりそれぞれ30 μg加え、5%CO₂の存在下37℃で3日間培養した。試験例1と同様の方法で細胞を培養容器より剥がした。この細胞をCa⁺⁺とMg⁺⁺を含まないダルベッコ

培地あるいは患者の年齢、体重、病態により異なるが、概ね1日100～3000mgを1回又は数回投与する。

非経口製剤としては、薬物の水性又は非水性溶液剤あるいは乳剤が挙げられる。非水性の溶液剤又は乳剤の基剤としては、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、グリセリン、オリーブ油、とうもろこし油、オレイン酸エステル等が挙げられる。

また、経口剤としては、カプセル剤、錠剤、顆粒剤、散剤等が挙げられる。

これらの製剤に賦形剤として、澱粉、乳糖、マンニト、エチルセルロース、ナトリウムカルボキシメチルセルロース等が配合され、溶剤としてステアリン酸マグネシウム又はステアリン酸カルシウムを添加する。結合剤としては、ゼラチン、アラビアゴム、セルロースエステル、ポリビニルピロリドン等が用いられる。

次に本発明の製剤例について説明する。

(実施例)

である。

N-〔3-(4-フロロフェニル)-2-プロペニル〕-1-

デオキシノジリマイシン	200	mg
乳糖	130	mg
ジヤガイモ澱粉	70	mg
ポリビニルピロリドン	10	mg
ステアリン酸マグネシウム	2.5	mg

乳糖及びジヤガイモ澱粉を混合し、これにポリビニルピロリドンの20%エタノール溶液を加え、均一に混濁させ、1mmの網目のふるいを通し、45℃にて乾燥させ、再度1mmの網目のふるいを通した。こうして得られた顆粒をステアリン酸マグネシウムと混合し錠剤に成型した。

(発明の効果)

本発明は癌細胞転移抑制作用を有する極めて有用な物質である。そして、この物質を有効成分とした癌細胞転移抑制剤は、現在この防止手段が殆ど無く、癌治療者の予後を左右する最大の課題である癌細胞の転移を解決した極めて有用な発明

特許出願人

明治製菓株式会社

代理人

小 堀 昌 (ほか1名)

第1頁の続き

⑦発明者	鶴岡	崇士	神奈川県横浜市港北区師岡町760	明治製菓株式会社中央研究所内
⑧発明者	山本	治夫	神奈川県横浜市港北区師岡町760	明治製菓株式会社中央研究所内
⑨発明者	福安	春海	神奈川県横浜市港北区師岡町760	明治製菓株式会社中央研究所内

手 続 補 正 書

平成元年10月27日 逆

特許庁長官 宮 田 文 蔵 殿

1. 事件の表示

平成1年 特 許 願 第127499号

2. 発明の名称 新規N-置換-1-デオキシノジリマイシン
誘導体及びそれを含有する癌細胞転移抑制剤

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

氏 名 (609) 明 治 製 薬 株式会社

4. 代 理 人

住 所 ⑧ 812 福岡市博多区博多駅前1丁目1-1
博多新三井ビル西092-451-8781

氏 名 (8216) 弁理士 小 堀 益 子

5. 補正の対象

明細書

6. 補正の内容




方式 ④

5の炭化水素基を表し、この炭化水素基は二重又は三重結合を有していてもよい、Zはフェニル基、フッソ置換フェニル基、ピフェニル基、シクロアルキル基又はハロゲン置換アルキル基を表す、

で示されるN-置換-1-デオキシノジリマイシン誘導体又はその薬理的に許容される酸との付加塩を有効成分とすることを特徴とする癌細胞転移抑制剤。」

(2) 明細書第4頁の式(1)を下記の通り補正する。




(3) 明細書第3頁第12～14行「従って、この・・・課題である。」を下記の通り補正する。

「従って、現行の癌治療の有効性は癌細胞の転移を抑制すること、さらに高められることが期待される。」


(4) 明細書第15頁下から第9行「ケニル化試剤と

(1) 特許請求の範囲を下記の通り補正する。



式中、Aは水酸基、ハロゲン化アルキル基又はアルコキシ基で置換されてもよい炭素数3乃至5の炭化水素基を表し、この炭化水素基は二重又は三重結合を有していてもよい、Zはフェニル基、フッソ置換フェニル基、ピフェニル基、シクロアルキル基、又はハロゲン置換アルキル基を表す、


で示されるN-置換-1-デオキシノジリマイシン誘導体。



式中、Aは水酸基、ハロゲン化アルキル基、アルコキシ基で置換されてもよい炭素数3乃至

各種アルコール類」を「ケニル化試剤と1-デオキシノジリマイシンを各種アルコール類」に補正する。

(5) 明細書第16頁の式(14)、(15)、(16)をそれぞれ下記の通り補正する。




DESCRIPTION

1. TITLE OF THE INVENTION

NOVEL N-SUBSTITUTED-1-DEOXYNOJIRIMYCIN DERIVATIVE AND
CANCER CELL ANTIMETASTATIC AGENT INCLUDING THE SAME


2. PATENT CLAIMS

1. An N-substituted-1-deoxynojirimycin derivative
represented by the following formula,



wherein A represents a hydrocarbon group of 3 to 5 carbon atoms optionally substituted with hydroxyl, alkyl halide or alkoxy group, the hydrocarbon group optionally comprising a double or triple bond, and Z represents phenyl, fluorinated phenyl, biphenyl, cycloalkyl or halogenated alkyl group.

2. A cancer cell antimetastatic agent characterized by an active ingredient which is an N-substituted-1-deoxynojirimycin derivative represented by the following formula or an addition salt thereof with a pharmaceutically acceptable acid,



wherein A represents a hydrocarbon group of 3 to 5 carbon atoms optionally substituted with hydroxyl, alkyl halide or alkoxy group, the hydrocarbon group optionally comprising a double or triple bond, and Z represents phenyl, fluorinated phenyl, biphenyl, cycloalkyl or halogenated alkyl group.

3. DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

[Industrial Field of Application]

The present invention relates to a novel N-substituted-1-deoxynojirimycin derivative which inhibits formation of cancer cell metastases and a cancer cell antimetastatic agent containing the same as the active ingredient.

[Conventional Technique]

Various anticancer agents are currently in use. Majority of them are drugs which kill cancer cells or let human immune system destroy them, but a drug effective for fundamental treatment of cancers has not been obtained yet.

Solid cancers, to which chemotherapeutic agents have low effectiveness, are treated with physical therapies

such as surgery or radiotherapy, and the success rate is greatly improved from a viewpoint of removing primary cancer. It is however also true that metastases of cancer cells are induced on the other side.

[Problem to be Solved by the Invention]

As described above, metastasis of cancer cells are the biggest problem in conventional cancer treatments which affects prognosis of patients with cancer.

Therefore, it is currently desired the most to develop an anticancer agent which can enhance suppression of cancer cell metastasis.

In order to achieve the above object, it is the purpose of the present invention to provide a substance which effectively suppresses cancer cell metastases and a cancer cell antimetastatic agent containing the same as the active ingredient.


[Means for Solving the Problem]

The present inventors found N-substituted-1-deoxynojirimycin derivatives having a cancer cell antimetastatic effect prior to the present invention, and disclosed them in Japanese patent application publication Nos. Sho63-31095, Sho63-93673, Sho63-97454, Sho63-104850, Sho63-147815 and Sho63-147816.

The present inventors further synthesized novel N-

substituted derivatives of 1-deoxynojirimycin and broadly evaluated them, and then found a group of novel compounds having a strong cancer cell antimetastatic effect. The present invention has been thus accomplished.

The present invention is an N-substituted-1-deoxynojirimycin derivative represented by formula 1, and a cancer cell antimetastatic agent containing the compound or the addition salt thereof with a pharmaceutically acceptable acid as the active ingredient,



(1)

wherein A represents a hydrocarbon group of 3 to 5 carbon atoms optionally substituted with hydroxyl, alkyl halide or alkoxy group, the hydrocarbon group optionally comprising a double or triple bond, and Z represents phenyl, fluorinated phenyl, biphenyl, cycloalkyl or halogenated alkyl group.

The N-substituted-1-deoxynojirimycin derivative shown by formula 1 of the present invention is a novel substance which has not ever described in documents.

The following substances are examples of the compounds included in the novel N-substituted-1-deoxynojirimycin derivative:

N-(3-methoxymethyl-3-phenyl-2-propeny)-1-

deoxynojirimycin,
 N-(3-phenyl-3-trifluoromethyl-2-propenyl)-1-
 deoxynojirimycin,
 N-[3-(4-fluorophenyl)-2-propenyl]-1-deoxynojirimycin,
 N-[3[(3-fluorophenyl)-2-propenyl]-1-deoxynojirimycin,
 N-[3[(2-fluorophenyl)-2-propenyl]-1-deoxynojirimycin,
 N-[3-(4-biphenylpropyl)]-1-deoxynojirimycin,
 N-[3-(4-fluorophenyl)-propyl]-1-deoxynojirimycin,
 N-(3-cyclohexylpropyl)-1-deoxynojirimycin,
 N-(3-phenyl-2-propnyl)-1-deoxynojirimycin,
 N-(2,3-dihydroxy-3-phenylpropenyl)-1-deoxynojirimycin,
 N-(6,6,6-trifluorohexyl)-1-deoxynojirimycin,
 N-(5,5,5-trifluoropentyl)-1-deoxynojirimycin, and
 N-(4,4,4-trifluorobutyl)-1-deoxynojirimycin.

When the N-substituted-1-deoxynojirimycin derivative
 of the present invention is used as a cancer cell
 antimetastatic agent, the pharmaceutically acceptable acid
 addition salt thereof includes addition salts of:
 inorganic acids such as hydrochloric acid, hydrobromic
 acid, sulfuric acid, nitric acid and phosphoric acid;
 organic acids such as formic acid, acetic acid, propionic
 acid, succinic acid, glycolic acid, lactic acid, malic
 acid, tartaric acid, citric acid, maleic acid, fumaric
 acid, benzoic acid, salicylic acid and methanesulfonic
 acid; and also amino acids such as asparaginic acid and
 glutamic acid.

All compounds of the present invention are novel compounds which have not ever described in documents. According to the most general synthesis method thereof, 1-deoxynojirimycin (see Tetrahedron, 24, 2125(1968)) is used as the raw material, which is obtained by reducing nojirimycin-(5-amino-5-deoxy-D-glucopyranose) (see Japanese patent application publication No. Sho43-760) which is a metabolite of an actinomycete found by the present inventors. Specifically, the N-substituted A-Z group of formula 1 of the present invention may be introduced by heating or leaving at room temperature 1-deoxynojirimycin with an aralkyl- or aralkenylation agent typified by aralkyl halide or alkenyl halide, aralkylsulfonate ester or aralkenylsulfonate ester, etc. in polar solvent such as alcohols, dimethylformamide, dimethylacetamide, dimethylsulfoxide, sulfolane and the mixture thereof in the presence of a deoxidizing agent such as alkali hydroxide, alkali carbonate, alkali bicarbonate, suitable organic amines, etc. It is also possible to employ a method such that the raw material is 1-deoxynojirimycin whose hydroxyl group is protected by a suitable protecting group, for example acetyl, benzoyl, tetrahydropyranyl, t-butyldimethylsilyl, or the like, and is subjected to the N-substitution reaction followed by deprotection. Furthermore, also available are: a method to carry out so-called reductive alkylation by use of an


agent with carbonyl group as an reactive agent in hydrogen atmosphere under a reductive condition, for example conditions in the presence of formic acid, sodium cyanoborohydride, sodium borohydride or a suitable metal catalyst of platinum oxide, palladium or Raney nickel; and a method to obtain an objective product by reducing an amide compound of 1-deoxynojirimycin with aralkylcarbonic acid or aralkenylcarbonic acid. According to need, these compounds are subjected to a general purification procedure such as recrystallization, column chromatography, etc., so as to obtain the compound of formula 1 of the present invention.

The substitution group of the compound of the present invention may be formed and introduced by any method suitable for the purpose. The following five production methods are given as suitable methods to produce an aralkyl-, aralkenyl- or aralkynylation agent for constructing the A-Z group of formula 1.

[Production Method 1]

Compound 3 may be synthesized by the reaction of compound 2 with a vinyl-metal compound, for example vinylmagnesium chloride, divinylmagnesium bromide, vinylmagnesium iodide, vinyl lithium, divinylzinc, divinylcopper, divinylcesium, or the like, in nonpolar solvent, preferably in ether, tetrahydrofuran or dioxane, at -50°C to room temperature for 10 minutes to 24 hours.

Compound 4 may be synthesized by the reaction of compound 3 with hydrochloric acid, hydrobromic acid, oxalyl chloride, thionyl halide, oxyphosphorus halide, phosphorus trihalide, phosphorus pentahalide, tri-substituted phosphine-carbon tetrahalide, allyl- or alkylsulfonyl halide without solvent or in solvent such as benzene, toluene, ether, methylene chloride, acetonitrile, etc. at 0°C to 100°C for 30 minutes to 24 hours, the reaction being accompanied with transfer of the allyl alcohol part of compound 3.




In the formula, Y_1 represents hydrogen atom, halogen atom, aralkyl or hydroxyl group, Y_2 represents hydrogen atom, halogen atom, aralkyl, alkoxy or halogen-substituted alkyl group, X represents halogen atom or alkyl- or allylsulfonyloxy group. The halogen atom denotes chlorine, brome, iodine atom, etc., and the alkyl- or allylsulfonyloxy group denotes methane sulfonyloxy, trifluoromethane sulfonyloxy, p-toluene sulfonyloxy group, etc. M represents mono- or divalent metal or the salt

thereof, and the metal denotes lithium, sodium, potassium, magnesium, zinc, cesium or copper.

[Production Method 2]

Unsaturated ester 5 is synthesized by the reaction of compound 2 with carboalkoxymethylene tri-substituted phosphorane in suitable solvent, preferably benzene, toluene, ether, tetrahydrofuran, dioxane, methylene chloride, chloroform, methanol and ethanol, at 0°C to 60°C for 10 minutes to 24 hours, or with diaralkylphosphonoacetic acid aralkylester in the presence of a suitable base, for example sodium hydride, potassium hydride, alkali hydride or alkali carbonate, at 0°C to 60°C for 10 minutes to 24 hours. Compound 6 may be synthesized by the reaction of compound 5 with a suitable metal hydride complex reductant, preferably lithium aluminum hydride, diisobutylaluminum hydride, sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride, or the like, in suitable aprotic solvent, preferably ether, tetrahydrofuran or dioxane, at -78°C to -100°C for 30 minutes to 18 hours. Compound 4 may be synthesized by the reaction of compound 6 with hydrochloric acid, hydrobromic acid, oxalyl chloride, thionyl halide, phosphorus trihalide, phosphorus pentahalide, tri-substituted phosphine-carbon tetrahalide, allyl- or alkylsulfonyl halide without solvent or in solvent such as benzene, toluene, ether, methylene chloride, acetonitrile etc. at 0°C to 100°C for 30 minutes

to 24 hours.




In the formula, Y_1 and Y_2 represent the same as above, and R represents a protection group of carboxyl such as alkyl.

[Production Method 3]

Saturated alcohol 7 may be synthesized by the reduction of alkenylalcohol 6 obtained in production method 2 in the presence of a metal catalyst, for example palladium-carbon, platinum, Raney nickel, or the like, in suitable organic solvent, for example methanol, ethanol, acetic acid, tetrahydrofuran, ethyl acetate, or the like, in hydrogen atmosphere for 30 minutes to 24 hours.

Compound 8 may be synthesized by the reaction of compound 7 in solvent such as hydrobromic acid, oxalyl chloride, thionyl halide, phosphorous oxyhalide, phosphorous trihalide, phosphorous pentahalide, tri-substituted phosphine-carbon tetrahalide, allyl- or alkylsulfonyl halide, etc. at 0°C to 100°C for 30 minutes to 24 hours.




In the formula, Y_1 , Y_2 and X represent the same as

above.

[Production Method 4]

Alkynylalcohol 10 may be synthesized by acetylidation of 1-allylacetylene derivative 9 with a suitable base, for example n-butyllithium, lithium diisopropylamide, sodium amide or the like, followed by reaction with formalin. Compound 11 may be synthesized by the reaction of compound 10 with oxalyl chloride, thionyl halide, phosphorous oxyhalide, phosphorous trihalide, phosphorous pentahalide, tri-substituted phosphine-carbon tetrahalide or allyl- or alkylsulfonyl halide without solvent or in solvent such as benzene, toluene, ether, methylene chloride, acetonitrile, etc. at 0°C to 100°C for 30 minutes to 24 hours.



In the formula, Y1, Y2 and X represent the same as above.

[Production Method 5]

As a production method of a terminally halogenated alkylation agent, for example, a trifluoromethyl derivative 13 may be synthesized by treating ω-halogenated fatty acid 12 with a suitable fluorinating agent, for example sulfur tetrafluoride (Angew. Chem. Internat. Ed., 1, 467(1962)).




In the formula, X represents the same as above.

The N-substituted A-Z group of the compound of formula 1 in the present invention may be introduced by heating or leaving at room temperature with an aralkyl- or aralkenylation agent typified by the aralkyl halide or aralkenyl halide produced by the above production methods 1 to 5 and aralkylsulfonate ester or aralkenylsulfonate ester in polar solvent such as alcohols, dimethylformamide, dimethylacetoamide, dimethylsulfoxide, sulfolane, etc. or the mixture thereof in the presence of a deoxidizing agent such as alkali hydroxide, alkali carbonate, alkali bicarbonate or suitable organic amines. It is also possible to employ a method such that the raw material is 1-deoxynojirimycin whose hydroxyl is protected by a suitable protecting group, for example acetyl, benzoyl, tetrahydropyranyl, t-butyldimethylsilyl, or the like, and N-substitution reaction is carried out followed by deprotection. Among the compounds included in the present invention, the ones of formula 1 where A is a hydroxyl-substituted hydrocarbon may be produced according to the following production method 6.

[Production method 6]

Objective product 16 may be obtained by the reaction

of N-substituted-1-deoxynojirimycin derivative 14, which may be synthesized by the reaction of the alkenylation agent synthesized according to production method 1 or 2 with 1-deoxynojirimycin or 1-deoxynojirimycin with protected hydroxyl, with a suitable oxidization agent, for example osmium tetroxide, or the like.



In the formula, Y_1 and Y_2 represent the same as above, R' represents hydrogen atom, acetyl, benzil, benzoyl, pivaloyl, t-butyldimethylsilyl or tetrahydropyranyl group.

Next, production examples of the N-substituted-1-deoxynojirimycin derivative of the present invention are shown.

[Production Example 1]:

N-(3-phenyl-3-trifluoromethyl-2-propenyl)-1-deoxynojirimycin

[Step 1]:

3-phenyl-3-trifluoromethyl-2-propene-1-ol

A solution of 1.74 g (10.0 mmol) 2,2,2-trifluoroacetophenone, which was dissolved in 10 ml of

tetrahydrofuran, was cooled to -78°C , and 1M vinylmagnesiumbromide solution in tetrahydrofuran was added dropwise. Following to the addition, the solution was stirred for 3 hours, and further for 1 hour without the cool bath. Water was added to decompose excess reagent in ice bath, and the solvent was then distilled away. 10 ml of 2N sulfuric acid was added to the residue, and extraction was carried out with ethyl acetate. The extract was washed with water, dried and then concentrated. The residue was purified with silica gel column chromatography (eluting solvent: ether-hexane (1:10)), so as to obtain 1.66 g (82%) of oily product.

NMR (CDCl_3) δ

2.61 (s, 1H), 5.52 (d, 1H), 5.62(d, 1H),

6.43 (dd, 1H), 7.25-7.70 (m, 5H)

[Step 2]:

1-bromo-3-phenyl-3-trifluoromethyl-2-propene

606 mg (3.00 mmol) of 3-phenyl-3-trifluoromethyl-2-propene-1-ol and 943 mg (3.60 mmol) of triphenylphosphine were dissolved in 4 ml of acetonitrile and cooled in ice bath. 1.26 g (3.80 mmol) of carbon tetrabromide was then added in several parts. The solution was stirred for 1 hour in ice bath, and then further stirred overnight at room temperature. The reaction was diluted with 10 ml of ether, deposited solid was filtered off, and the filtrate was concentrated. The obtained residue was purified with

silica gel column chromatography (eluting solvent: hexane), so as to obtain 440 mg (55%) of oily product.

NMR (CDCl₃) δ

3.80 (dq, 2H), 8.62 (tq, 1H), 7.20-7.60 (m, 5H)

[Step 3]:

N-(3-phenyl-3-trifluoromethyl-2-propenyl)-1-deoxynojirimycin

163 mg (1.00 mmol) of deoxynojirimycin and 318 mg (1.20 mmol) of 1-bromo-3-phenyl-3-trifluoromethyl-2-propene were dissolved in 5 ml of dimethylformamide. 207 mg (1.50 mmol) of potassium carbonate was added and the solution was stirred for 8 hours at room temperature. Saturated salt solution was added to the reaction mixture, and extraction was carried out with n-butanol. The extract was concentrated under reduced pressure, and the residue was purified with silica gel column chromatography (eluting solvent: chloroform-methanol (10:1)), so as to obtain 311 mg (90%) of colorless solid product.

NMR (CD₃OD) δ

2.15 (m, 2H), 3.10 (dd, 1H), 3.16 (t, 1H),

3.31 (m, 1H), 3.42 (t, 1H), 3.53 (m, 1H),

3.78 (dd, 1H), 3.96 (ABX type, 2H),

6.72 (t, 1H), 7.32 (m, 2H), 7.46 (m, 3H)

[Production Example 2]:

N-(3-metoxymethyl-3-phenyl-2-propenyl)-1-deoxynojirimycin

The synthesis was carried out by use of 1-bromo-3-

metoxymethyl-3-phenyl-2-propene which was synthesized in the same manner as production method 1.

NMR (CD₃OD) δ

2.13 (m, 2H), 3.06 (dd, 1H), 3.16 (t, 1H),
3.34 (m, 1H), 3.44 (t, 1H), 3.31 (m, 1H),
3.38 (s, 3H), 3.76 (dd, 1H),
3.97 (ABX type, 2H), 4.16 (s, 2H),
6.06 (t, 1H), 7.15-7.50 (m, 5H)

[Production example 3]:

N-[3-(4-fluorophenyl)-2-propenyl]-1-deoxynojirimycin

[Step 1]:

Methyl-3-(4-fluorophenyl)-2-propenoate

1.24 g (10.0 mmol) of 4-fluorobenzaldehyde was dissolved in 20 ml of methylene chloride. 3.67 g (11.0 mmol) of carbomethoxymethylenetriphenylphosphorane was added, and the mixture was stirred for 3 hours at room temperature. Solid was filtered off, the filtrate was concentrated, and the residue was purified with silica gel chromatography (eluting solvent: ethyl acetate-hexane (1:4)), so as to obtain 1.61 g (90%) of colorless needle crystal.

NMR (CDCl₃) δ

4.30 (d, 2H), 6.25 (m, 1H), 6.55 (d, 1H),
6.95 (m, 2H), 7.35 (m, 2H)

[Step 2]:

3-(4-fluorophenyl)-2-propene-1-ol)

1.61 g (9.00 mmol) of methyl-3-(4-fluorophenyl)2-propenoate was dissolved to 50 ml of ether, and the solution was dropwise added to 205 mg (5.40 mmol) of lithium aluminum hydride suspended in 3 ml of ether in ice bath. Stirring for 30 min at room temperature after the addition, excess reagent was then decomposed with water, and solid was filtered off. The filtrate was concentrated, so as to obtain 1.33 g (97%) of 3-(4-fluorophenyl)-2-propene-1-ol.

NMR (CDCl₃) δ

4.52 (d, 2H), 6.31 (m, 1H), 7.01 (m, 2H),

7.45 (m, 2H)

[Step 3]:

1-bromo-3-(4-fluorophenyl)-2-propene

1.34 g (8.82 mmol) of 3-(4-fluorophenyl)-2-propene-1-ol and 4.26 g (11.5 mmol) of tri-n-octylphosphine was dissolved in 20 ml of ether, and 3.52 g (10.6 mmol) of carbon tetrabromide was added in several parts in ice bath. After stirring for 30 min at room temperature, precipitate was filtered off, the filtrate was concentrated, and the residue was purified with silica gel column chromatography (eluting solvent: hexane), so as to obtain 1.61 g (85%) of colorless oily product.

NMR (CDCl₃) δ

3.35 (d, 2H), 6.30 (m, 1H), 7.00 (m, 2H),

7.40 (m, 2H)

Mass m/z 214, 216

[Step 4]:

N-[3-(4-fluorophenyl)-2-propenyl]-1-deoxynojirimycin

1.61 g (7.5 mmol) of 1-bromo-3-(4-fluorophenyl)-2-propene and 1.22 g (7.5 mmol) of 1-deoxynojirimycin were dissolved in 10 ml of dimethylformamide. 3.12 g (22.5 mmol) of Potassium carbonate was added and stirred 24 hours at room temperature. Water was added to the reaction mixture, and extraction was carried out with n-butanol. After distilling away the solvent, the residue was purified with silica gel column chromatography (eluting solvent: chloroform-methanol (10:1)), so as to obtain 1.36 g (61%) of pale yellow solid product.

NMR (CD₃OD) δ

2.4-4.2 (m, 16H), 6.40 (m, 1H), 6.7 (m, 1H),
7.10 (m, 2H), 7.55 (m, 2H)

Mass m/z 298 (FD, M+1)

[Production Example 4]:

N-[3-(3-fluorophenyl)-2-propenyl]-1-deoxynojirimycin

The synthesis was carried out in the same manner as production example 3.

NMR (CD₃OD) δ

2.15 (m, 2H), 3.04 (dd, 1H), 3.14 (t, 1H),
3.2-3.35 (m, 1H), 3.39 (t, 1H),
3.49 (m, 1H), 3.68 (dd, 1H),
3.94 (ABX type, 2H), 6.41 (dt, 1H),

6.59 (d, 1H), 6.95 (dt, 1H), 7.16 (dd, 1H),

7.21 (d, 1H), 7.31 (ddd, 1H)

Mass m/z 298 (FD, M+1)

[Production Example 5]:

N-[3-(2-fluorophenyl)-2-propenyl]-1-deoxynojirimycin

The synthesis was carried out in the same manner as production example 3.

NMR (CD₃OD) δ

2.1-2.25 (m, 2H), 3.06 (dd, 1H),

3.14 (t, 1H), 3.24-3.35 (m, 1H),

3.39 (t, 1H), 3.50 (m, 1H), 3.71 (m, 1H),

3.94 (ABX type, 2H), 6.45 (dt, 1H),

6.72 (d, 1H), 7.0-7.16 (m, 2H),

7.2-7.28 (m, 1H), 7.53 (dt, 1H)

Mass m/z (FD, M+1)

[Production Example 6]:

N-[3-(4-biphenyl)propyl]-1-deoxynojirimycin

[Step 1]:

1.10 g (6.00 mmol) of methyl-3-(4-biphenyl)acrylate-4-biphenylcarboxyaldehyde was dissolved in 20 ml of dichloroethane. 3.03 g (9.10 mmol) of carbomethoxymethylenetriphenylphosphorane was added, and the solution was stirred for 1 hour at room temperature. After distilling away the solvent, the residue was purified with silica gel column chromatography (eluting solvent: ether-hexane (1:10)), so as to obtain 1.12 g

(78%) of colorless crystal.

NMR (CDCl₃) δ

3.83 (s, 3H), 6.49 (d, 1H), 7.30-7.60 (m, 9H),

7.75 (d, 1H)

[Step 2]:

Methyl-3-(4-biphenyl)propionate

1.40 g (4.40 mmol) of methyl-3-(4-biphenyl)acrylate was dissolved in 50 ml of ethyl acetate. 70 mg of 10% Pd-C was added to carry out catalytic reduction under ambient pressure for 12 hours. After filtering off the catalyst, the solvent was distilled away so as to obtain 1.01 g (97%) of colorless oily product.

NMR (CDCl₃) δ

2.68 (t, 2H), 3.00 (t, 2H), 3.68 (s, 3H),

7.20-7.70 (m, 9H)

[Step 3]:

3'-(4-biphenyl)-1-propanol

To suspension of 110 mg (2.90 mmol) lithium aluminum hydride in 10 ml of ether, solution of 1.01 g (4.20 mmol) of methyl-3-(4-biphenyl)propionate in 35 ml of ether was added dropwise in ice bath. After stirring for 1 hour at the same temperature, excess reagent was decomposed with water, inorganic product was filtered off, and the filtrate was dried and concentrated, so as to obtain 861 mg (96%) of colorless crystal.

NMR (CDCl₃) δ

1.56 (br, 1H), 1.94 (m, 2H), 2.77 (m, 2H),
3.71 (m, 2H), 7.15-7.76 (m, 9H)

[Step 4]:

3-(4-biphenyl)-1-bromopropane

419 mg (2.00 mmol) of 3-(4-biphenyl)-1-propanol and 629 mg (2.40 mmol) of triphenylphosphine was dissolved in 10 ml of ether. 930 mg (2.80 mmol) of carbon tetrabromide was added in ice bath in several parts. After stirring for 1 hour at room temperature, precipitate was filtered off, the filtrate was concentrated, and the residue was purified with silica gel column chromatography (eluting solvent: hexane), so as to obtain 506 mg (92%) of colorless oily product.

NMR (CDCl₃) δ

2.20 (quin, 2H), 2.83 (t, 2H), 3.44 (t, 2H),
7.23-7.65 (m, 9H)

[Step 5]:

N-[3-(4-biphenyl)propyl]-1-deoxynojirimycin

140 mg (0.50 mmol) of 3-(4-biphenyl)-1-bromopropane and 82 mmol (0.5 mmol) of 1-deoxynojirimycin were dissolved in 1 ml of dimethylformamide. 136 mg (1.00 mmol) of potassium carbonate was added and heated at 80°C for 4 hours. Water was added, and the reaction mixture was acidified with hydrogen chloride and washed with ether. The aqueous phase was alkalized with ammonia, and extraction was carried out with n-butanol. After removing

the solvent, the residue was purified with silica gel column chromatography (eluting solvent: chloroform-methanol (10:1), so as to obtain 117 mg (66%) of solid product.

NMR (CD₃OD) δ

1.86 (m, 2H), 2.20 (br, 2H), 2.65 (m, 3H),
2.89 (m, 1H), 3.00 (m, 1H), 3.14 (t, 1H),
3.47 (m, 1H), 3.84 (d, 2H), 7.15-7.65 (m, 9H)

[Production Example 7]:

N-[3-(4-fluorophenylpropyl)]-1-deoxynojirimycin

The synthesis was carried out in the same manner as production example 6.

NMR (CD₃OD) δ

1.38 (m, 2H), 2.05-2.22 (m, 2H), 2.64 (m, 2H)
2.98 (dd, 1H), 3.13 (t, 1H), 3.30 (m, 1H),
3.38 (t, 1H), 3.45 (m, 1H),
3.64 (m, 1H), 3.85 (m, 2H), 7.18-7.35 (m, 4H)

[Production Example 8]

N-(3-cyclohexylpropyl)-1-deoxynojirimycin

The synthesis was carried out with the same manner as production example 6.

NMR (CD₃OD) δ

0.75-1.08 (m, 2H), 1.08-1.45 (m, 7H),
1.45-2.00 (m, 6H), 2.70-3.83 (m, 8H),
4.00 (ABX type, 2H)

[Production Example 9]:

N-(phenyl-2-propynyl)-1-deoxynojirimycin

[Step 1]:

1-phenyl-3-bromopropin

660 mg (5.00 mmol) of 1-phenyl-2-propin-1-ol and 4.98 g (15.0 mmol) of carbon tetrabromide were dissolved in 30 ml of tetrahydrofuran. 2.62 g (10.0 mmol) of triphenylphosphine was added thereto in ice bath in several parts. After stirring for 10 hours at room temperature, solid was filtered off and the filtrate was concentrated. The residue was purified with silica gel column chromatography (eluting solvent: hexane), so as to 181 mg (65%) of colorless oily product.

NMR (CDCl₃) δ

1.20 (br, 1H), 2.27 (s, 1H), 7.15-7.40 (m, 5H)

[Step 2]:

N-(phenyl-2-propynyl)-1-deoxynojirimycin

163 mg (1.00 mmol) of 1-deoxynojirimycin and 215 mg (1.10 mmol) of 1-phenyl-3-bromopropyne were dissolved in 3 ml of dimethylformamide. 166 mg (1.20 mmol) of potassium carbonate was added thereto and stirred for 8 hours at room temperature. Water was added, and the reaction mixture was acidified with hydrogen chloride and washed with ether. The aqueous phase was alkalized with ammonia, and extraction was carried out with n-butanol. After distilling away the solvent, the residue was purified with silica gel column chromatography (eluting solvent:

chloroform-methanol (10:1)), so as to obtain 181 mg (65%) of solid product.

NMR (CD₃OD) δ

2.31 (d, 1H), 2.57 (t, 1H), 2.98 (dd, 1H),

3.19 (t, 1H), 3.50 (t, 1H), 3.61 (m, 1H),

3.82 (ABX type, 2H), 3.98 (dd, 2H)

[Production Example 10]:

N-[(2,3-dihydroxy)-3-phenylpropyl]-1-deoxynojirimycin

[Step 1]:

N-(3-phenyl-2-propenyl)-1-deoxynojirimycin tetraacetate

1.42 g (7.20 mmol) of cinnamylbromide and 978 mg (6.00 mmol) of 1-deoxynojirimycin were suspended in 10 ml of dimethylformamide. 996 mg (7.20 mmol) of Potassium carbonate was added and heated at 60 to 65°C for 4 hours. After cooled, the mixture was diluted with 3 ml of methylene chloride. 3.06 g (30.0 mmol) of acetic anhydride and 2.37 g (30.0 mmol) of pyridine were added and stirred for 16 hours at room temperature. The reaction was diluted with 150 ml of ethyl acetate, washed with saturated sodium hydrogen carbonate solution and subsequently with water. After dried, the solvent was then distilled away. The residue was purified with silica gel column chromatography (eluting solvent: hexane-ethyl acetate (3:1)), so as to obtain 2.12 g (81%) of crystal.

NMR (CDCl₃) δ

2.01 (s, 6H), 2.03 (s, 3H), 2.09 (s, 3H),

2.38 (dd, 1H), 2.70 (dt, 1H), 3.25 (dd, 1H),
 3.38 (dd, 1H), 3.59 (ddd, 1H), 4.19 (dd, 1H),
 4.32 (dd, 1H), 4.90-5.20 (m, 3H), 6.22 (dt, 1H),
 6.56 (d, 1H), 7.15-7.50 (m, 5H)

[Step 2]:

N-[(2,3-dihydroxy)-3-phenylpropyl]-1-deoxynojirimycin
 tetraacetate

305 mg (0.70 mmol) of N-(3-phenyl-2-propenyl)-1-deoxynojirimycin tetraacetate and 98 mg (0.84 mmol) of N-methylmorpholine-N-oxide were dissolved in 8 ml of 50% acetone. 2 mg of osmium tetroxide was added and stirred for 2 hours. After adding 250 mg of sodium nitrite and 3 ml of water and stirring for 1 hours, the solution was diluted with 30 ml of water and extraction was carried out with ethyl acetate. After washed with water and dried, the solvent was distilled away. The residue was purified with silica gel column chromatography (eluting solvent: hexane-ethyl acetate (1:1)), so as to obtain 222 mg (68%) of caramel product. This compound was a mixture (2:1) of two stereoisomers.

NMR (CDCl₃) δ

2.32 (dd), 2.57 (dd), 2.70 (ABX type), 2.85 (dd),
 2.97 (m), 3.11 (s), 3.12 (dd), 3.16 (s), 3.22 (dd),
 3.82 (br), 4.13 (ABX type), 4.20 (ABX type),
 4.48 (t), 4.53 (t), 4.86-5.12 (m),
 7.2-7.4 (m, 5H)

[Step 3]:

N-[(2,3-dihydroxy)-3-phenylpropyl]-1-deoxynojirimycin

196 mg (0.42 mmol) of N-[(2,3-dihydroxy)-3-phenylpropyl]-1-deoxynojirimycin tetraacetate was dissolved in 5 ml of methanol. 3 mg of potassium carbonate was added and stirred for 3 hours at room temperature. After distilling away the solvent, the residue was purified with silica gel column chromatography (eluting solvent: chloroform-methanol (3:1)), so as to obtain 128 mg (98%) of colorless caramel product. This compound was a mixture (2:1) of two stereoisomers.

NMR (CD₃OD) δ

2.05 (dd), 2.17 (dd), 2.23-2.35 (m), 2.54 (dd),
2.87 (dd), 2.98 (dd), 3.10 (t), 3.14 (t),
3.2-4.0 (m), 4.50 (d), 4.68 (d),
7.15-7.50 (m, 5H).

Next, shown are results of evaluating cancer cell antimetastatic effect of the N-substituted deoxynojirimycin derivatives of the present invention.

[Effect Test]

[Test Method]

From melanoma B16 strain, which is a mouse tumor cell, a B16 high metastatic strain was selected for use based on the Fidler's method (Method in Cancer Research, 15, 339-439, 1978). Antimetastatic effect was evaluated based on the method of Kijima-Suda and others (Proc.,

Natl., Acad., Sci., U.S.A., 83, 1752-1756, 1986; Cancer Research, 46, 858-862, 1986.). First, the B16 high metastatic strain was seeded on Dulbecco's ME medium (DME medium) containing fetal bovine serum. N-substituted-1-deoxynojirimycin represented by general formula 1 was added, and the cells were cultured for 2 to 4 days at 37°C in the presence of 5% CO₂. The grown cells were peeled from the culture vessel with trypsin-EDTA solution. These cells were suspended in Dulbecco's balanced salt solution without Ca⁺⁺ and Mg⁺⁺ at 1×10⁶ cells/1 ml based on living cells.

Mice were injected with 0.1 ml of this suspension via tale vine to transplant the cells. After grown for 14 days, the lungs were extirpated by laparotomy. The number of the surface and internal metastatic nodes of B16 high metastatic strain formed on the lungs was counted and compared with the control which was not treated with the agent.

[Test Example 1]: Cellular Cytotoxicity

The B16 high metastatic strain was cultured in DME medium containing 10% fetal bovine serum at 37°C in the presence of 5% CO₂. The cells were peeled from the culture vessel with trypsin-EDTA solution, and suspended at 1×10⁴ cells per 1 ml. 150 µl of the suspension were added to and mixed with each 50 µl of test drug and control drug solution. The cells were then cultured for 4

days, and the living/dead thereof was observed under an inverted microscope to decide cellular cytotoxicity. The result is shown in Table 1.

Table 1

Used cell	B16 high metastasis strain	
Added drug	Concentration	Viability
Non-added		+
Compound of Production Example 9	10 $\mu\text{g/ml}$	+
	30 $\mu\text{g/ml}$	+
	100 $\mu\text{g/ml}$	+
Compound of Production Example 10	10 $\mu\text{g/ml}$	+
	30 $\mu\text{g/ml}$	+
	10 $\mu\text{g/ml}$	+
Compound of Production Example 7	10 $\mu\text{g/ml}$	+
	30 $\mu\text{g/ml}$	+
	100 $\mu\text{g/ml}$	+
Adriamycin (control)	0.1 $\mu\text{g/ml}$	-

"+" represents "living" and "-" represents "dead".

According to the test result, the compounds of the present invention did not have cellular cytotoxicity to B16 high metastatic strain.

[Test Example 2]: Antimetastatic Effect

B16 high metastatic strain was seeded to DME medium containing 10% fetal bovine serum. Each test drug was added at 30 μg per 1 ml, and the cells were cultured for 3 days at 37°C in the presence of 5% CO₂. The cells were peeled from the culture vessel in the same way as test example 1. These cells were suspended in Dulbecco's

balanced salt solution without Ca^{++} and Mg^{++} at 1×10^6 cells/1 ml based on living cells. BDF₁ Mice (8 weeks old, male) were injected with 0.1 ml thereof via tail vein to transplant the cells. After grown for 14 days, the lungs were extirpated by laparotomy. The number of the surface and internal metastatic nodes of B16 high metastatic strain formed in the lungs was counted. The result is shown in Table 2.

Table 2

Added drug	The number of lung metastatic nodes (average \pm standard deviation)
Non-added	207 \pm 47
Compound of Production Example 9 (30 $\mu\text{g/ml}$)	96 \pm 29
Compound of Production Example 10 (30 $\mu\text{g/ml}$)	60 \pm 18
Compound of Production Example 7 (30 $\mu\text{g/ml}$)	18 \pm 7

According to the result, the treatment with the compounds of the present invention greatly reduced the number of metastatic nodes formed in the lung.

The cancer cell antimetastatic agent of the present invention is oral or parenteral formulate containing the above N-substitued-1-deoxynojirimycin derivative, and clinically administered via vein, artery, skin, subcutaneous, intracutaneous, rectum or muscle, or orally. It is expected that direct administration to a tumor brings intense effect. The dose, which depends on

administration route, dosage form, and age, weight and condition of a patient, is basically 100 to 3,000 mg per day and given one or several times.

As the parenteral formulate, there can be given sterile aqueous and non-aqueous liquid formulation and emulsion formulation. As the base of the non-aqueous liquid formulation and emulsion formulation, there can be given propylene glycol, polyethylene glycol, glycerin, olive oil, corn oil, ethyl oleate, etc.

As the oral formulate, there can be given capsule, tablet, granule, powder, etc.

To these formulates, starch, lactose, mannite, ethylcellulose, sodium carboxymethylcellulose or the like is blended as excipient, and magnesium stearate or calcium stearate is added as lubricant. As binder, gelatin, gum arabic, cellulose ester, polyvinylpyrrolidone or the like is used.

Next, a formulation example of the present invention is described.

[Example]

N-[3-(4-fluorophenyl)-2-propenyl]-1-deoxynojirimycin: 200 mg

lactose: 130 mg

potato starch: 70 mg

polyvinylpyrrolidone: 10 mg

magnesium stearate: 2.5 mg

Lactose and potato starch were mixed and wetted uniformly with 20% solution of polyvinylpyrrolidone in ethanol. The mixture was filtered with 1 mm mesh, dried at 45°C, and filtered with 1 mm mesh again. The obtained granule was mixed with magnesium stearate, and shaped to tablets.

[Advantage of the Invention]


The present invention is a highly useful substance having cancer cell antimetastatic effect. The cancer cell antimetastatic agent containing this substance as the active ingredient solves the problem of cancer cell metastasis, which there is currently little countermeasure for and affects prognosis of patients with cancer the most, and is therefore a highly useful invention.

AMENDMENT

6. Content of Amendment


(1) The patent claims are amended as follows.

"1. An N-substituted-1-deoxynojirimycin derivative represented by the following formula,




wherein A represents a hydrocarbon group of 3 to 5 carbon atoms optionally substituted with hydroxyl, alkyl halide or alkoxy group, the hydrocarbon group optionally comprising a double or triple bond, and Z represents phenyl, fluorinated phenyl, biphenyl, cycloalkyl or halogenated alkyl group.

2. A cancer cell antimetastatic agent characterized by an active ingredient which is an N-substituted-1-deoxynojirimycin derivative represented by the following formula or an addition salt thereof with a pharmaceutically acceptable acid,



wherein A represents a hydrocarbon group of 3 to 5 carbon atoms optionally substituted with hydroxyl, alkyl halide or alkoxy group, the hydrocarbon group optionally comprising a double or triple bond, and Z represents phenyl, fluorinated phenyl, biphenyl, cycloalkyl or halogenated alkyl group."

(2) On p.4 (p.4) of the description, formula 1 is amended as follows:



(1)

(3) On p.3, 1.12-14 (p.3, 1.10-12) of the description, "Therefore, it is ... cancer cell metastasis." is amended as follows.

"Therefore, it is expected that suppression of cancer cell metastasis further improves the effectiveness of current cancer treatments."

(4) On p.15 in the 9th line from the bottom (p.12, 1.4-5) of the description, "... heating or leaving at room temperature with an aralkyl- or aralkenylation agent ..." is amended as follows.

"... heating or leaving at room temperature 1-

nojirimycin with an aralkyl- or aralkenylation agent ..."

(5) On p.16 (p.13) of the description, formulae (14), (15) and (16) are amended as follows.

